

	F 01 Informovaný souhlas – Radiodiagnostika	Strana: 1	Z celku: 2	Vydání č.2
	<b>Informovaný souhlas - CT ENTEROGRAFIE</b>			Účinnost od: 1.9.2015

**Příjmení a jméno:**.....

**RČ pacienta :** .....

### CT pracoviště - tel. 327 305 272 - objednávky

**Vážená paní/pane, toto je poučení o zdravotním výkonu, který Vám má být proveden:**

**CT enterografie** - je rtg metoda, při které je na CT vyšetřeno tenké střevo po speciální přípravě pacienta.

**Účelem tohoto vyšetření je** zobrazit a odlišit pomocí aplikované JKL (jodové kontrastní látky) jednotlivé tkáně a tím odhalit patologické změny ve vyšetřované oblasti.

#### **Příprava pacienta:**

- 1 den před vyšetřením bezobzbovká strava (vynechte nadýmavou stravu – luštěniny, syrová zelenina, ovoce, čerstvé a celozrnné pečivo, maso, zcela vynechat mléko a všechny mléčné výrobky, vyhněte se nápojům s bublinkami), vysadte preparáty železa, diabetici 48 hod před vyšetřením vysadí biguanidy (Adimet, Avandamet, Diaphage, Glibomet, Glucovance, Gluformin, Langerin, Metfirex, Metfogamma, Metformin, Siofor, Stadamet, Glucophage)
- v den vyšetření jen tekutiny dle potřeby, nejíst

#### **Vyšetření bude probíhat takto:**

- před samotným vyšetřením budete pít 1,5 - 2,5 litru Manitolu asi po dobu 45minut dle pokynů laborantky. Pijte pomalů – jeden kelímek pijte 15 minut!
- před vyšetřením dostanete do žíly kanylu pro aplikaci jodové kontrastní látky a léku pro relaxaci střev.
- CT vyšetření bude provedeno nativně a po aplikaci jodové kontrastní látky.
- délka samotného vyšetření je do 10 min.
- po vyšetření můžete mít průjem, protože Manitol se nevstřebává.

#### **Alternativa místo shora uvedeného lékařem doporučeného výkonu:**

Výhody této metody - jednoznačná alternativa proti doporučenému vyšetření není. Magnetická rezonance má speciální indikace a není totožná s vyšetřením CT. Bez aplikace JKL má CT ve vybraných indikacích omezenou výpovědní hodnotu.

Nevýhody - nevýhodou této metody je riziko na podání JKL a ozáření pacienta.

#### **Kontraindikace:**

- Obecně na Buscopan – glaukom, hyperplazie prostaty
- Obecně na jodové k.l. – alergie, hyperfunkce št. žlázy, diabetici na biguanidech (nutné vysadit 48hod před vyšetřením)

Vyšetření i při uvedených kontraindikacích se provádí pouze při stavech život ohrožujících z tzv. vitální indikace.

#### **Lékařem doporučený výkon má následující rizika:**

Alergické reakce případně krvácení z místa vpichu kanyly.

Možné komplikace výkonu po podání kontrastní látky:

i při zcela správném provedení celého výkonu může dojít k mírnějším, nebo i vážným komplikacím.

- menší krvácení z žíly, nebo podání kontrastní látky pod kůži mimo žílu, není nebezpečné a obvykle nevyžaduje zvláštní léčbu, může však být nepříjemné, bolestivé a dočasně zachovat

Městská nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav, Radiodiagnostické oddělení,  
prim. MUDr. Josef Ondrašík, tel.327305121., e-mail: josef.ondrasik@nemcaslav.cz

**Informovaný souhlas - CT ENTEROGRAFIE**

modřinu.

- během podání kontrastní látky do žíly, nebo i později mohou být pocity tepla. Tyto pocity, pokud se dají bez problémů vydržet, nejsou nebezpečné a nejde o komplikaci.

**Reakce na K.L. může mít různou závažnost:**

- mírná nevolnost, kopřivka, či jiné kožní projevy, mírný bronchospasmus a mírný pokles krevního tlaku. Tento typ reakcí se zvládne podáním léků do žíly.
- Závažnější reakce na JKL jsou křeče, edem plic, laryngeální edem, hypotenze a tachykardie. Takové reakce jsou však dnes při podstatně lepší kvalitě kontrastních látek vzácné. Pokud jste již v minulosti po podání jodové kontrastní látky nějakou reakci měl/měla, hlase tuto skutečnost indikujícímu lékaři i lékaři provádějícímu výkon.
- Zvýšené riziko je u lidí nad 70 let, alergiků, diabetiků, u pacientů s poškozenou funkcí ledvin,
- u osob s předchozí reakcí na kontrastní látku, dehydratace, kardiální dekompenzace.
- prevence kontrastní nefropatie je řádná hydratace, vysazení perorálních antidiabetik 48 hod. před aplikací JKL, vysazení léků působících nepříznivě na ledviny typu Gentamycinu, Cisplatinu, diclofenac, aulin, ibuprofen apod.
- Tzv. pozdní reakce na JKL může vzniknout v rozmezí 3-48 hodin projevující se lehkou či střední urtikou (kožní vyrážkou).

**Každé vyšetření tohoto typu je prováděno kontaktem s anesteziologicko-resuscitačním oddělením nemocnice s možností okamžité resuscitace při náhlých reakcích těžšího typu.**

**Po vyšetření je nutná dostatečná hydratace (příjem tekutin) během 24 hod.**

**V průběhu 3 měsíců se nedoporučuje absolvovat vyšetření štítné žlázy na radioizotopovém oddělení (nutno informovat příslušného lékaře).**

Omezení v obvyklém způsobu života po provedení CT vyšetření bez komplikací není prakticky žádné.

**Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že jsem poučení přečetl/a a měl/a jsem možnost klást otázky lékaři a rdg asistentovi, které mi byly zodpovězeny. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením zdravotního výkonu CT s aplikací jodové kontrastní látky.**

**Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví.**

V Čáslavi dne .....

.....  
Podpis pracovníka, který poučení provedl

.....  
Vlastnoruční čitelný podpis pacienta

Podpis svědka, pokud se pacient nebo zákonný zástupce nemůže vlastnoručně podepsat (uvést důvod):

.....  
Jméno a příjmení

.....  
podpis

Datum a podpis pacienta při opakovaném provedení výkonu: