



IS-CHIR 19

Strana: 1

Z celku: 2

Verze č.: 1

**INFORMOVANÝ SOUHLAS
EXTIRPACE Z PODKOŽÍ NEBO SVALU (ODSTRANĚNÍ LOŽISKA)****INFORMOVANÝ SOUHLAS****Extirpace z podkoží nebo svalu
(odstranění ložiska z podkoží nebo svalu)****Jméno a příjmení pacienta:**.....**Rodné číslo pacienta:**

Vážená paní, vážený pane

Zdravotní výkon, který Vám doporučujeme, vyžaduje Váš **INFORMOVANÝ SOUHLAS**. Informovaný souhlas znamená, že budete v následujícím textu podrobně, odborně, a pro Vás srozumitelně poučen/a o navrhovaném postupu léčby. Dále Vás poučíme o možných rizicích a následcích zdravotního výkonu.

Název zdravotního výkonu:

Extirpace z podkoží nebo svalu (odstranění ložiska z podkoží nebo svalu)

Důvod a cíl výkonu:

Operace se provádí za účelem odstranění patologického procesu (zhoubného, nezhojbného onemocnění) z podkoží nebo svalu, či stanovení přesné diagnózy. Na žádost pacienta může být výkon proveden také z estetického důvodu.

Povaha a následky výkonu:

Výkony menšího rozsahu mohou být prováděny v lokální anestezii (v místním znecitlivění), výkony většího rozsahu jsou prováděny v celkové anestezii (celkové narkóze). U výkonů prováděných v celkové anestezii pacient nesmí v den výkonu od půlnoci jíst, pít, ani kouřit.

Vzhledem k možnosti použití elektrokauteru (elektrického nože) během operace, je nutné před výkonem odložit všechny kovové předměty a šperky a informovat lékaře o přítomnosti kovových implantátů či kardiostimulátoru. Vlastní výkon se provádí po desinfekci kůže, kdy operátor odstraní podkožní ložisko či podkožní tkáň s ložiskem. V některých případech je nutné odstranit spolu s podkožím také část kůže. Tato odstraněná tkáň je obvykle odeslána k histopatologickému vyšetření. U ran většího rozsahu někdy lékař zavádí do operovaného místa drén (gumovou hadičku), který je po operaci napojen na systém s odsáváním a slouží k odvádění sekretů (tekutiny). U ran menšího rozsahu je někdy zaveden gumový rukavicový drén, který sekret odvádí přímo do obvazu. Na konci výkonu se provede sešití rány.



IS-CHIR 19

Strana: 2

Z celku: 2

Verze č.: 1

**INFORMOVANÝ SOUHLAS
EXTIRPACE Z PODKOŽÍ NEBO SVALU (ODSTRANĚNÍ LOŽISKA)****Rizika výkonu:**

- bolestivost v místě vpichu lokálního anestetika, nebo vznik hematomu (krevního výronu)
- alergická reakce na místní anestetikum – mravenčení kolem úst, dušnost, neklid, ospalost, křeče, poruchy vidění
- krvácení, infekce operační rány, infekce krevního řečiště
- dehiscence (rozevření) operační rány, hojení keloidní (hypertrofickou) jizvou

Méně časté:

- pooperační zápal plic
- poruchy srdečního rytmu, srdeční slabost, infarkt
- pooperační dechové potíže, někdy až s nutností napojení na umělou plicní ventilaci
- hluboká žilní trombóza (sraženina v krevním řečišti), plicní nebo jiná embolie (uvolnění krevní sraženiny do krevního oběhu s následným uzavřením cévy v cílovém orgánu, nejčastěji v plicích)
- důsledkem komplikací může být ž úmrtí pacienta

Hospitalizace a omezení, doporučení ve způsobu života:

U pacientů užívajících léky na srážení krve (Anopyrin, Warfarin...) je nutné, aby tyto léky byly vysazeny týden před plánovaným výkonem. Po výkonu je pacient umístěn na dospávací pokoj, kde je pod zdravotnickým dohledem minimálně jednu hodinu. Dle rozsahu výkonu a typu anestezie je následně buď propuštěn domů, nebo přeložen na standardní chirurgické oddělení. Doba hospitalizace je u nekomplikovaných výkonů několik dnů. Omezení pracovní schopnosti záleží na rozsahu výkonu a typu onemocnění.

Alternativy výkonu:

K léčbě či odstranění ložiska v podkoží není jiná alternativa než chirurgické řešení.

V Čáslavi (datum)

.....
Podpis pacienta (zákonného zástupce)