



IS-CHIR 13

Strana: 1

Z celku: 2

Verze č.: 1

**INFORMOVANÝ SOUHLAS
OPERACE CHRONICKÉ KONEČNÍKOVÉ TRHLINY, ČI POLYPU
KONEČNÍKU**

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Operace chronické konečníkové trhliny, či polypu konečníku

Jméno a příjmení pacienta:.....

Rodné číslo pacienta:

Vážená paní, vážený pane

Zdravotní výkon, který Vám doporučujeme, vyžaduje Váš INFORMOVANÝ SOUHLAS. Informovaný souhlas znamená, že budete v následujícím textu podrobně, odborně, a pro Vás srozumitelně poučen/a o navrhovaném postupu léčby. Dále Vás poučíme o možných rizicích a následcích zdravotního výkonu.

Název zdravotního výkonu:

Operace chronické konečníkové trhliny, či polypu konečníku

Důvod a cíl výkonu:

Operace se provádí za účelem ošetření přetrvávající konečníkové praskliny, zvýšeného napětí konečníkového svěrače jako příčiny vzniku chronické praskliny s eventuálním odstraněním polypů, vzniklých při okrajích praskliny.

Povaha a následky výkonu:

Vlastní výkon provádí vždy tým lékařů, specializovaných v oboru proktochirurgie (nemoci tlustého střeva konečníku. Operace trvá obvykle 15 – 30 minut a provádí se většinou v krátkém celkovém znecitlivění (narkóze, uspání), které řídí lékař specialista – anesteziolog. V indikovaných případech je možnou alternativou anestezie zavedení epidurálního bloku /injekce anestetika do páteřního kanálu), nebo aplikace anestetika přímo do oblasti konečníku. Tyto alternativy a Vámi projedná anesteziolog pře operaci. Před operací nesmíte 6 hodin nic jíst, pít, ani kouřit. Ráno před výkonem probíhá příprava konečníku klysmatem – aplikací vlažného fyziologického roztoku do konečníku pomocí hadičky za účelem vyprázdnění. Operace probíhá na speciálně upraveném stole. Při operaci je po pečlivém vyšetření konečníku prsty a anoskopem a šetrném rozražení svěrače na potřebnou šíři zjištěn rozsah postižení. Následně je odříznou zjizvený okraj praskliny i s eventuálně přítomným polypoidními výrůstky. Poté je defekt sešit vstřebatelným stehem. Na konci operace vkládáme do konečníku váleček ze vstřebatelné pěny, jako prevenci pooperačního krvácení. Odstranění tkáň je posílána na histologické vyšetření.



IS-CHIR 13

Strana: 2

Z celku: 2

Verze č.: 1

**INFORMOVANÝ SOUHLAS
OPERACE CHRONICKÉ KONEČNÍKOVÉ TRHLINY, ČI POLYPU
KONEČNÍKU**

Rizika výkonu:

I při správném postupu v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy (lege artis) mohou vzniknout v souvislosti s provedeným operačním zákrokem například tyto komplikace:

- větší krvácení z konečníku brzy po operaci, drobné krvácení (špinění) je běžné a není třeba řešit
- špatná funkce svěrače konečníku s následnou inkontinencí (porucha zadržování větrů a stolice)
- recidiva onemocnění zde bývá častá
- zúžení konečníku (stenóza), často po reoperacích a proběhlých zánětech
- zadržení moči při bolestech operovaného místa nebo v důsledku použité anestezie
- modřina (hematom) a otok konečníku
- infekce operační rány, močová infekce, infekce krevního řečiště
- poruchy srdečního rytmu, srdeční slabost, infarkt
- hluboká žilní trombóza (sraženina v krevním řečišti), embolie (uvolnění krevní sraženiny do krevního oběhu s následním uzavřením cévy v cílovém orgánu, nejčastěji v plicích)
- přechodné psychické komplikace (například stavy zmatenosti...), neurologické komplikace
- důsledkem komplikace může být až úmrtí pacienta

Hospitalizace a omezení, doporučení ve způsobu života:

Doba pobytu v nemocnici se pohybuje nejčastěji kolem 1 až 3 dnů. Omezení pracovní schopnosti může trvat i několik týdnů, záleží na rozsahu onemocnění. Po propuštění do domácího léčení je nutné dodržovat dietní režim – prevence zácpy, dbát na dostatečný příjem tekutin. Konečník po stolici sprchovat až 4x denně vlažnou mýdlovou vodou. V případě potřeby při propuštění proskribujeme účinná analgetika nejčastěji v tabletové formě. Pooperační kontrola po cca 1 týdnu od operace v poradně s doporučením dalšího postupu léčby.

Alternativy výkonu:

Neoperační postup – dieta, aplikace mastí, dezinfekcí, nebo čípků s obsahem látek, zklidňujících zánět. Použití přípravku na roztažení svěrače a zhojení praskliny bez operace (Dilatan), toto však při pokročilých dlouhotrvajících obtížích s již přítomnými polypy a zbytnění svěrače většinou nevede k vyřešení obtíží.

V Čáslavi (datum)

.....
Podpis pacienta (zákonného zástupce)