

	F 01 Příloha k Informovanému souhlasu - MN	Strana: 1	Z celku: 2	Vydání č.2
	CHIR 03/15	Cholecystektomie		Účinnost od: 1.9.2015

Vážená paní/pane, toto je poučení o zdravotním výkonu, který Vám má být proveden:

Cholecystektomie (CHE)

Cholecystektomie (zkratka CHE nebo CHCE) je operační odstranění žlučníku klasickou metodou. Používá se k odstranění žlučníku postiženého cholecystolitiazou (vyplnění žlučovými kameny či drtí), případně zánětem či nádorem. Jde o operační metodu prováděnou v celkovém znecitlivění na operačním sále. V dnešní době je v naprosté většině případů nahrazena laparoskopickou cholecystektomií (zkratka LACHE), která je šetrnější, méně bolestivá a má kratší dobu rekonvalescence, klasická operace se využívá pouze v menším procentu případů, kdy není z nějakého důvodu možné provést LACHE. K těmto případům patří předchozí břišní operace s velkou pravděpodobností vytvoření nitrobřišních srůstů, které by komplikovaly event. až znemožňovaly laparoskopickou operaci, dále extrémně obézní pacienti, prokázaný zhoubný nádor žlučníku, pacienti se závažným onemocněním srdce a plic znemožňujícím laparoskopii, plánovaná operace současně i dalších orgánů, kde je klasický přístup nutností. Na klasickou operaci je někdy nutno během operace změnit i původní laparoskopickou, když si to vyžádá operační průběh a nález.

K přístupu do dutiny břišní se využívá řez nejčastěji v pravém podžebří, ale je možný i přístup z řezu ve střední čáře nebo dalších. Během operace se vyšetří dostupné orgány a odstraní se žlučník, který je následně odeslán na mikroskopický rozbor. Pooperačně zůstává na břiše většinou 1 jizva cca 12 cm dlouhá a k tomu drobný vpich, z kterého je vyvedena mimo břišní dutinu hadička (drén), která slouží k odvádění zbytků krve, žluči nebo hnisu z břicha a ponechává se obvykle dle stavu pacienta cca 2 dny. Pooperačně je pacient přeložen na oddělení JIP, odkud se později vrací na standardní lůžkové oddělení. Domů se při nekomplikovaném průběhu propouští nejdříve 4. pooperační den, vše ale závisí od stavu pacienta a pooperačního průběhu, rekonvalescence po operaci je do měsíce.

Alternativní metodou k CHE je laparoskopická operace žlučníku pomocí minikamery a nástrojů zavedených do dutiny břišní jen drobnými vpichy. Výhodou LACHE je menší operační rána a menší jizva po operaci s kratší dobou hojení, menší bolestivost pooperačně a kratší rekonvalescence. Nevýhodou je o něco delší doba operace. Metodou volby je dnes celosvětově (kromě výjimečných případů) LACHE.

Každá operace nese s sebou **rizika** a žádné pracoviště ani chirurg nemůže zaručit nekomplikovaný průběh operačního výkonu a pooperačního průběhu. K známým všeobecným komplikacím operací patří infekce, krvácení během operace a po ní, nezhojení nebo komplikované hojení operační rány, vytvoření kýly v jizvě po operaci, alergická reakce na léky, dezinfekci, šicí nebo obvazový materiál používané při operaci, vytvoření srůstů po operaci způsobujících bolesti břicha, hluboká žilní trombóza a plicní embolie. Další komplikace mohou nastat ze strany anestezie. Některé z komplikací při závažném průběhu mohou vyžadovat až další operační výkon, podání krevní náhrady, prodloužení délky hospitalizace případně časté pooperační kontroly na chir. ambulanci. Ve zcela raritních případech může nastat během a po operačním výkonu i přes maximální úsilí celého operačního týmu smrt pacienta.

	F 01 Příloha k Informovanému souhlasu - MN		Strana: 2	Z celku: 2	Vydání č.2
	CHIR 03/15	Cholecystektomie			Účinnost od: 1.9.2015

K specifickým rizikům této operace patří možnost poškození zejména žlučových cest, jater, střeva nebo jiného orgánu při operaci, pooperační žloutenka způsobená kamínkem ve žlučových cestách, ponechání žlučového kamínku v dutině břišní, při elektrokoagulaci může raritně dojít i ke vzniku popálenin kůže. Pravděpodobnost výskytu komplikací je velmi nízká a je naší snahou ji minimalizovat. I když se komplikace vyskytne je ve většině případů řešitelná a odstranitelná.

Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života a zdraví.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně cholecystektomie, nebojte se s nimi obrátit na sestru nebo ošetřujícího lékaře.