

| | | | | |
|---|--------------------------|--|------------|----------------------------|
|  | F 00 Informovaný souhlas | Strana: 1 | Z celku: 2 | Vydání č.1 |
| | GYN 26/19 | ODSTRANĚNÍ ABSCESU (CYSTY) BARTHOLINSKÉ ŽLÁZY | | Účinnost od: 14.10.2019 |

Jméno a příjmení pacientky:

Rodné číslo:

Vážená paní, toto je poučení o zdravotním výkonu, který Vám má být proveden:

Odstranění abscesu (cysty) Bartholinské žlázy

Absces (cysta) Bartholiniho žlázy je ohraničené zduření Bartholiniho žlázy. Jde o párovou žlázku ležící v oblasti zadní poloviny vchodu poševního. Uzávěr vývodu žlázy je častý v oblasti zevního ústí. Příčinou uzávěru je nejčastěji infekce nebo trauma.

Možný způsob provedení výkonu

***Incize a drenáž:**

Výkon provádíme v lokální nebo celkové anestezii. Po dezinfekci zevních rodidel a pochvy vedeme podélný řez skalpelem v místě největšího vyklenutí nebo v rýze mezi velkým a malým stydkým pyskem. Dutinu cysty vyplachujeme dezinfekčním roztokem. V některých případech do rány zavedeme drén.

***Chirurgická exstirpace (odstranění)**

Exstirpaci preferujeme u chronických, recidivujících (opakujících se) cyst. Při vlastním operačním výkonu provádíme vyjmutí cysty vcelku podélným řezem v místě největšího vyklenutí. Výkon provádíme v celkové anestezii.

***Chemicko-chirurgická exstirpace**

V celkové anestézii provedeme malou incizi a zavedeme do cysty lapis, který způsobí po 24-48 hodinách nekrózu pouzdra abscesu. To je pak vcelku odstraněno za 48hod.

Rizika zákroku:

- Krvácení se vznikem hematomu řešíme klidem na lůžku, ledováním a tlakovou kompresí. Výjimečně je třeba provést evakuaci (vyprázdnění) hematomu s drenáží.
- Infekce a dlouhotrvající hojení má za následek vznik jizvy s funkčním i kosmetickým dopadem.
- Poranění rekta, pooperační nebo následná perforace infikovaného hematomu může vést ke vzniku rektoperineální píštěle.
- Peroperační perforace abscesu s následným neúplným odstraněním vede často k hojení keloidní jizvou s funkčním i kosmetickým defektem nebo i k recidivě.

Možná omezení způsobu života, nebo pracovní schopnosti:

Jedná se většinou o jednodenní výkon, pracovní neschopnost běžně není nutná.

Hojení trvá obvykle asi 2–3 týdny. Eventuálně nutné převazy u ambulantního gynekologa.

Dodržování zvýšené osobní hygieny, oplachy operační rány doporučeným dezinfekčním roztokem.

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|-----------|------------|----------------------------|
|  | F 00 Informovaný souhlas | | Strana: 2 | Z celku: 2 | Vydání č.1 |
| | GYN 26/19 | ODSTRANĚNÍ ABSCESE (CYSTY) BARTHOLINSKÉ ŽLÁZY | | | Účinnost od: 14.10.2019 |

Písemný souhlas pacientky:

Já, níže podepsaná pacientka, potvrzuji:

- že mi lékař vysvětlil můj zdravotní stav a navrhovaný zákrok. Jsem srozuměna s riziky, která jsou s tímto zákrokem spojena i s riziky, která jsou specifická s ohledem na můj zdravotní stav;
- že mě lékař seznámil s možnými alternativami a s možnými riziky;
- že mi bylo umožněno položit lékaři otázky týkající se mého zdravotního stavu, plánované procedury, případných dalších rizik a možných alternativ, které byly zodpovězeny k mé spokojenosti;

Byla jsem srozuměna s tím, že neexistuje záruka toho, že zákrok změní můj zdravotní stav k lepšímu, i s tím, že zákrok může můj stav zhoršit.

Já, pacientka, výše uvedenému rozumím a dávám písemný souhlas k vykonání zákroku.

Datum:

Jméno a podpis pacientky:

Jméno a podpis zákonného zástupce:
(vyplnit při potřebě)

Jméno a podpis lékaře: