INFORMOVANÝ SOUHLAS

Operační výkon na prsu

Jméno a příjmení pacienta:.....…….

Rodné číslo pacienta: .....…….

Vážená paní, vážený pane

Zdravotní výkon, který Vám doporučujeme, vyžaduje Váš INFORMOVANÝ SOUHLAS.
Informovaný souhlas znamená, že budete v následujícím textu podrobně, odborně, a pro Vás srozumitelně poučen/a o navrhovaném postupu léčby. Dále Vás poučíme o možných rizicích a následcích zdravotního výkonu.

Název zdravotního výkonu:
Operační výkon na prsu

Důvod a cíl výkonu:
Operace se provádí za účelem odstranění patologického procesu v prsu (zánět, nezhoubný nádor, ložisko drobného zvápenatění apod.) s cílem prevence možného vzniku zhoubného bujení, nebo jiných komplikací choroby.

Povaha a následky výkonu:
Pokud v prsní žláze není ložisko, které je učení k odstranění hmatné, bude před vlastní operací označeno pod ultrazvukovou kontrolou (nákres na kůži, zavedení vodiče – tenkého drátku k ložisku). Při povrchovém uložení ložiska je možné operační výkon provést v lokálním znecitlivění (aplikace anestetika do okolí ložiska). Pokud je ložisko uloženo hluboko v prsní žláze, či v centrální části prsu, provádí se operace v celkové anestezii (v umělém spánku). Vlastní operace bude probíhat na operačním sále a ložisko bude z prsní žlázy odstraněno. Při větším rozsahu postižení bude do operačního pole zaveden drén (tenká hadička), který bude z rány odvádět tekutinu a v pooperačním období bude odstraněn. Na závěr operace bude provedena (pokud to bude potřeba) modelace prsní žlázy pro dobrý výsledný kosmetický efekt. Odstraněný materiál bude odeslán na patologii k podrobnému pracování a mikroskopickému vyšetření. Výsledek tohoto vyšetření bude znám za 7 – 10 dní. Při použití celkové anestezie nesmíte v den operace od půlnoci jíst, pít, ani kouřit.

Rizika výkonu:
I při správném postupu v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy (lege artis) mohou vzniknout v souvislosti s provedeným operačním výkonem například tyto komplikace:

- alergická reakce v místě zákroku
- krvácení
- pooperační dechové potíže
- porucha hojení operační rány – zánět, hnis v ráně
- pooperační zápal plic
- přechodné zažívací potíže (po celkové anestezii)
- močová infekce, infekce krevního řečiště
- poruch srdečního rytmu, srdeční slabost, infarkt
- hluboká žilní trombóza (sraženina v krevním řečišti), plicní, nebo jiná embolie (uvolnění krevní sraženiny do krevního oběhu s následným uzavřením cévy v cílovém orgánu, nejčastěji v plicích)
- přechodné psychické komplikace (například stavy zmatenosti…), neurologické komplikace (postižení mozku, nebo jednotlivých nervů)
- důsledkem komplikací může být až úmrtí pacienta

Hospitalizace a omezení, doporučení ve způsobu života:
Výkon může být proveden za krátkodobé hospitalizace, či ambulantně (po zákroku budete propuštěn/a do ambulantní péče). Tato operace není spojena s žádným dietním opatřením, od prvního pooperačního dne můžete jíst běžnou racionální stravu (ev. dietu, n kterou jste zvyklý/á). Při hospitalizaci se doba pobytu v nemocnici pohybuje kolem 3 až 5 dnů. Omezení pracovní schopnosti může trvat i několik dní, záleží na povolání, které vykonáváte. Po propuštění do domácího léčení je nutné dodržovat klidový režim do úplného zhojení ran. Bolesti v místě jizvy mohu trvat i několik měsíců.

Alternativy výkonu:
Neoperační řešení – riziko s možným negativním dopadem na Vaše zdraví.

V Čáslavi (datum) …… ……..……
Podpis pacienta (zákonného zástupce)