



IS-CHIR 18

Strana: 1

Z celku: 2

Verze č.: 1

**INFORMOVANÝ SOUHLAS
OŠETŘENÍ ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK KŮŽE (ABSCESU)****INFORMOVANÝ SOUHLAS****Ošetření zánětlivých ložisek kůže (abscesu)****Jméno a příjmení pacienta:**.....**Rodné číslo pacienta:**

Vážená paní, vážený pane

Zdravotní výkon, který Vám doporučujeme, vyžaduje Váš **INFORMOVANÝ SOUHLAS**.

Informovaný souhlas znamená, že budete v následujícím textu podrobně, odborně, a pro Vás srozumitelně poučen/a o navrhovaném postupu léčby. Dále Vás poučíme o možných rizicích a následcích zdravotního výkonu.

Název zdravotního výkonu:

Ošetření zánětlivých ložisek kůže (abscesu)

Důvod a cíl výkonu:

Vážení rodiče, Vaše dítě má pokročilé zánětlivé onemocnění (absces) kůže....., vzhledem k rozsahu zánětu a věku dítěte je nutné chirurgické ošetření v celkové anestezii. Celkovou anestezii můžeme podat až po určité době od posledního jídla a pití, abychom předešli komplikacím v průběhu anestezie.

Povaha a následky výkonu:

Ošetrání hnisavého ložiska (abscesu) spočívá v provedení kožního nářezu (incize) a uvolnění zánětlivého sekretu (hnis). Poté je třeba odstranit odumřelou tkáň, nečistoty, případně cizí těleso (např. třísku). Dále se provádí výplach ložiska a zavedení drénu, který bude odvádět další zánětlivou tekutinu z ložiska. Vždy je nutno ověřit rozsah a hloubku ložiska, zda nejsou poraněny hluboké struktury (šlachy, cévy, nervy, nebo svaly), jejichž porušení by vedlo k omezení funkce postižené části těla (například končetiny). Takový chirurgický zákrok je bolestivý a nelze jej provádět v místním znecitlivění.

V dalších dnech jsou nutné převazy zánětlivého ložiska. Tyto většinu provádíme bez celkové anestezie. Pokud ale trvají nebo se zhoršují zánětlivé změny kůže, je nutné opakované ošetření v celkové anestezii. Operační rány po ošetření abscesů se nešíjí, po zvládnutí infekce se spontánně hojí.



IS-CHIR 18

Strana: 2

Z celku: 2

Verze č.: 1

**INFORMOVANÝ SOUHLAS
OŠETŘENÍ ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK KŮŽE (ABSCESU)****Rizika výkonu:**

U rozsáhlejších a hlubokých abscesů jsou větší rizika dalšího hnisání, krvácení z rány, vznik jizev s nepříznivým kosmetickým efektem. Velmi vzácně dochází ke vzniku jizev, omezujících hybnost postižené oblasti, či poruchu její citlivosti.

Hospitalizace a omezení, doporučení ve způsobu života:

U nekomplikovaných ložisek je hospitalizace 2 – 3 dny. U pacientů s rozsáhlými abscesy, které si vyžadují opakované převazy v celkové anestezii, se doba pobytu v nemocnici může prodloužit až na 2 týdny. Celková doba léčení závisí na rozsahu a lokalizaci zánětu. Nekomplikované abscesy se zhojí za 2 týdny, u velkých a hlubokých ložisek trvá léčení 1 – 2 měsíce.

Alternativy výkonu:

Bez chirurgického ošetření zánětlivého ložiska se výrazně zvyšuje riziko šíření infekce do okolních tkání, nebo rozvoj celkového zánětu (otrava krve).

V Čáslavi (datum)

.....
Podpis pacienta (zákonného zástupce)